



# Mirena®

levonorgestrel 20 µg/24 tim

30 år på svenska marknaden!

## GODKÄND SOM PREVENTIVMEDEL I 8 ÅR

Bayer har tre hormonspiraler. Här kan du se likheter och skillnader.

	Mirena levonorgestrel	Kyleena levonorgestrel	Jaydess levonorgestrel
<b>Indikation</b>	<b>Antikonception i upp till 8 år</b> Idiopatisk menorrhagi och skydd mot endometriehyperplasi under pågående substitutionsbehandling med östrogen i upp till 5 år.	<b>Antikonception i upp till 5 år</b>	<b>Antikonception i upp till 3 år</b>
<b>Pearl Index år 1 (effektivitet)</b>	0,21	0,16	0,41
<b>Total mängd levonorgestrel (LNG)</b>	52 mg	19,5 mg	13,5 mg
<b>Medelutsöndring LNG in vivo under 8, 5 och 3 år</b>	13 µg/dygn	9 µg/dygn	6 µg/dygn
<b>Amenorrhé efter 8, 5 respektive 3 år</b>	34%	23%	12%
<b>T-skelettets storlek</b>	32x32 mm	28x30 mm	28x30 mm
<b>Insättningsrörets diameter</b>	4,4 mm	3,8 mm	3,8 mm
<b>Färg på trådarna</b>	Brun	Blå	Brun
<b>Differentiering vid ultraljud</b>	–	Silverring förbättrar synligheten	Silverring förbättrar synligheten

**Mirena®**, intrauterint inlägg , levonorgestrel 20 µg/24 timmar

Indikation: Antikonception i upp till 8 år. Idiopatisk menorrhagi och skydd mot endometriehyperplasi under pågående substitutionsbehandling med östrogen i upp till 5 år. **Biverkningar:** Huvudvärk, humörförändringar, acne och blödnings-störningar, cystor på äggstockarna, inflammation i yttre könsorganen eller slidan. Besvären är ofta lindriga och försvinner efter några månaders användning. **Varningar/försiktighet:** Mirena bör användas med försiktighet eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av följande tillstånd föreligger eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, fokal migrän med asymmetriskt synbortfall, gulsot, högt blodtryck, stroke eller hjärtinfarkt. Vid diagnos av bröstcancer bör uttag av Mirena övervägas. Kvinnor som överväger att låta sätta in en Mirena bör informeras om tecken och symtom samt på risken för ektopisk graviditet. Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva symtom. Före förskrivning vänligen läs produktresumé på [fass.se](http://fass.se) Antikonceptionellt medel G02BA03. Rx. F. För mer info och pris, se [www.fass.se](http://www.fass.se) SPC 2022-11-15 MA-MIR-SE-0002-1 NOV 2022

**Kyleena®**, intrauterint inlägg, 19,5 mg levonorgestrel. **Indikation:** Antikonception i upp till 5 år. **Biverkningar:** Huvudvärk, buk/bäckensmärtor, acne/fet hy och förändringar i blödningsmönstret, cystor på äggstockarna, inflammation i yttre könsorganen eller slidan. Besvären är ofta lindriga och försvinner efter några månaders användning.

**Varningar/försiktighet:** Kyleena bör användas med försiktighet eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av följande tillstånd föreligger eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, gulsot, fokal migrän med asymmetriskt synbortfall, högt blodtryck, stroke eller hjärtinfarkt. Kvinnor som överväger att låta sätta in en Kyleena ska informeras om tecken och symtom samt på risken för ektopisk graviditet. Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar eller depressiva symtom. Före förskrivning, vänligen läs produktresumé på [fass.se](http://fass.se) Antikonceptionellt medel G02BA03. Rx. F. För mer info och pris, se [www.fass.se](http://www.fass.se) SPC 2022-06-22. MA-KYL-SE-0007-1 Sept 2022

**Jaydess®**, intrauterint inlägg, 13,5 mg levonorgestrel **Indikation:** Antikonception i upp till 3 år. **Biverkningar:** Huvudvärk, buk/bäckensmärtor, acne/fet hy och förändringar i blödnings-mönstret, cystor på äggstockarna, inflammation i yttre könsorganen eller slidan. Besvären är ofta lindriga och försvinner efter några månaders användning. **Varningar/försiktighet:** Jaydess bör användas med försiktighet eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av följande tillstånd föreligger eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, fokal migrän med asymmetriskt synbortfall, gulsot, högt blodtryck, stroke eller hjärtinfarkt. Kvinnor som överväger att låta sätta in en Jaydess bör informeras om tecken och symtom samt på risken för ektopisk graviditet. Till kvinnor som inte fött barn är Jaydess inte ett förstahandsval eftersom den kliniska erfarenheten är begränsad. Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva symtom. Före förskrivning vänligen läs produktresumé på [fass.se](http://fass.se) Antikonceptionellt medel G02BA03. Rx. F. För mer info och pris, se [www.fass.se](http://www.fass.se) SPC 2022-06-22 ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. MA-JAY-SE-0001-1 Sept 2022



Bayer AB  
Box 606, 169 26 Solna  
Tel: 08-580 223 00

